Herbicida

SKADI®

ACABA CON LAS MALAS HIERBAS

Elevada eficacia y persistencia contra malas hierbas.
Amplio espectro de acción contra malas hierbas, incluso contra gramíneas resistentes a herbicidas foliares.
Elevada selectividad con todas las variedades de lechuga, escarola y endibia.
Flexibilidad de empleo en diferentes condiciones de cultivo.
Incluido en los Reglamentos de Producción Integrada.

CERTIS

www.certiseurope.es

INFORMACIÓN GENERAL

SKADI es un herbicida residual y sistémico, a base de propizamida. Es absorbido fácilmente por las raíces de las malas hierbas, especialmente en su fase de germinación. El espectro de acción de SKADI es muy amplio.

Su formulación ha sido optimizada para conseguir la máxima eficacia, para garantizar la seguridad y persistencia en el cultivo.

SKADI es absorbido por las raíces de las malas hierbas, inhibiendo la división celular (mitosis). Posteriormente a su absorción, SKADI se trasloca a toda la planta, afectando a los puntos en activo crecimiento. Una vez realizado el tratamiento, cesa inmediatamente la competencia de las malas hierbas con el cultivo.

SKADI es más activo en suelos ligeros que en aquellos pesados con un elevado contenido en materia orgánica.

ESPECTRO DE ACCIÓN

El espectro de acción de SKADI incluye a especies de malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas. SKADI es efectivo incluso contra vallico y otras gramíneas resistentes a herbicidas foliares.

Malas hierbas sensibles	
Gramíneas	**Dicotiledóneas**
Lolium spp. (raigrás, vallico), *Triticum aestivum* (trigo), *Bromus spp.* (bromo), *Avena fatua* (avena loca), *Poa spp.* (poa), *Phalaris spp. (*alpiste), *Alopecurus spp.* (cola de zorra), *Setaria spp.* (setaria), *Digitaria.*	*Stellaria media* (pamplina), *Diplotaxis spp.* (jaramago), *Sinapis arvensis* (amarillas), *Brassica nigra* (mostaza negra), *Portulaca oleracea* (verdolaga), *Urtica spp.* (ortigas), *Malva spp.* (malva), *Chenopodium album* (cenizo), *Lamium* y *Polygonum.*
Malas hierbas con media sensibilidad	
Gramíneas	**Dicotiledóneas**
Hordeum vulgare (cebada), Echinochloa crus-galli	*Papaver rhoeas* (amapola), *Veronica spp.* (verónica), *Capsella bursa-pastoris* (zurrón de pastor), *Galium aparine* (lapa), *Fumaria spp.* (conejitos), *Amaranthus retroflexus* (bledo), *Matricaria spp.* (manzanilla).

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis	Plazo de seguridad
Endibia, escarola y lechuga	Malas hierbas anuales	1,75 – 3,75 l/ha	30
Alfalfa		1,75 /ha	
Colza		1,75 l/ha	150

MODO DE EMPLEO (en lechuga, endibia y escarola)

Dosis y volumen de aplicación: 1,75-3,75 L/ha en 800-1000 L/ha de caldo. Utilizar la dosis superior en terrenos pesados (alto contenido de materia orgánica y/o arcilla).

Momento de aplicación: Para optimizar la eficacia del tratamiento, SKADI debe aplicarse al terreno previamente labrado, antes de la emergencia de las malas hierbas o en post emergencia temprana y sobre todas las variedades de siembra directa así como de trasplante, en pre o post siembra y en pre o post trasplante del cultivo. Una vez aplicado, incorporar mediante un riego ligero (no necesario si hay lluvias). El riego debe ser realizado 24 horas tras el tratamiento en verano, y entre 48 y 72 horas después del tratamiento en invierno. Ante temperaturas por encima de los 25ºC, es recomendable repetir el riego entre 7 y 10 días después del tratamiento.

Composición	Propizamida 40% p/v
Formulación	Suspensión concentrada
Nº Registro	17.845
Presentación	Garrafa de 5L